

索引

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|------------|-------------|-----|------------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|---------|---------|------------|-----------------|------------|-------------|------------|------|----------|------------|--------------|------|------------|------|--------------|-----|----|-----|----|---------------------|------------|
| あ行 | アセトアミノフェン | 18 | アヘン | 18 | 依存の予防 | 36 | 医療保険システム | 15 | 医療用麻薬 | 18 | 嘔気・嘔吐 | 41 | オピオイド | 18 | オピオイド受容体 | 18 | オピオイド治療 | 15 | オピオイド鎮痛薬 | 18 | オピオイド誘発性痛覚過敏 | 44 | オピオイド乱用・依存 | 15 | オピオイドローテーション | 38 | | | | | |
| か行 | 覚せい剤 | 19 | 患者選択 | 30 | 緩和ケア | 26 | 急性耐性形成 | 36 | 急性中毒 | 41, 45 | 減量・中止 | 38 | 減量のタイミング | 38 | 向精神薬 | 19 | 呼吸抑制 | 26 | コデイン | 23, 37, 50 | | | | | | | | | | | |
| さ行 | 習慣性医薬品 | 19 | 周術期の管理 | 26 | 術後痛 | 26 | 使用障害 | 31 | 徐放製剤 | 24 | 心因性[疼]痛 | 28 | 身体依存 | 47 | 身体機能 | 30 | 心理・社会的背景 | 29 | 睡眠障害 | 44 | 生活の質 (QOL) | 26 | | | | | | | | | |
| | 精神依存 | 47 | 性腺機能不全 | 43 | 増量のタイミング | 36 | 速放製剤 | 24 | た行 | タイトレーション | 36 | 退薬症候 | 38, 45 | 地方厚生 (支) 局麻薬取締部 | 54 | 中止のタイミング | 39 | 長期処方 | 43 | 腸機能障害 | 44 | 痛覚過敏 | 44 | 適正処方 | 22 | 同意書 | 32 | 突出痛 | 39 | トラマドール/アセトアミノフェン配合錠 | 23, 37, 50 |
| | モルヒネ | 23, 37, 52 | や行 | 薬事法 | 20 | 薬物依存 | 15 | 用量調節 | 36 | ら行 | 乱用・依存 | 46 | 乱用・依存の危険兆候 | 47 | 乱用・依存の早期発見 | 47 | レスキュー | 39 | | | | | | | | | | | | | |
| | ナロキソン塩酸塩 | 45 | 妊娠・授乳 | 49 | は行 | 非がん性慢性[疼]痛 | 15, 26 | フェンタニル貼付剤 | 23, 37, 52 | 副作用 | 41 | 物質依存の有無 | 28 | 物質探査行動 | 47 | ブプレノルフィン貼付剤 | 23, 37, 51 | 便秘 | 41 | | | | | | | | | | | | |
| | 麻薬 | 18 | 麻薬及び向精神薬取締法 | 20 | 麻薬携帯輸出 (輸入) 許可申請 | 54 | 眠気 | 42 | 免疫系の異常 | 44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |